



Chirurgische Gemeinschaftspraxis

Dres. Wagner & Presting

Mundenheimerstr. 254

67061 Ludwigshafen

Tel. 0621 565215

Fax 0621 569303

e-mail praxis@chirurgie-lu.de

web www.chirurgie-lu.de

Hämorrhoiden, Analfissur, Fisteln

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient

Sie werden in den nächsten Tagen wegen einer obig. Erkrankung operiert. Diese Eingriffe werden in unserem Operationsraum durchgeführt, d.h. während der Operation stehen Ihnen modernste Operationseinrichtungen und Narkoseverfahren zur Verfügung, wenige Stunden nach der Operation können Sie dann nach Hause zurück.

Sorgen Sie bitte dafür, dass unmittelbar nach der Operation jemand zu Hause ist damit Sie dann nicht allein sind. Zur häuslichen Betreuung bedarf es keines besonderen medizinischen Sachverständes, der "gesunde Menschenverstand" ist absolut ausreichend. Vor der Operation erhalten Sie ein Rezept für Schmerzmittel, 3 Netzhosen und einen Einlauf. Den Einlauf machen Sie sich bitte 2 Stunden bevor Sie am Operationstag in die Praxis kommen. 1 Netz hose nehmen Sie bitte in den Vorbereitungsraum mit und legen sie dort unter Ihr Kopfkissen. Während der Operation wird in Ihrem After eine Kompresse mit schmerzbetäubendem Gel eingelegt. Bitte belassen sie diese Kompresse. Nur wenn Sie Stuhlgang haben sollten, entfernen Sie diese; dabei kann es dann etwas bluten, was aber ganz normal ist. Am Tag nach der Operation kommen Sie bitte in die Praxis zur Nachkontrolle.

Hämorrhoiden: Hier wird die Haut innen am After aufgetrennt, die zuführende Arterie unterbunden und die Hämorrhoidenknoten unter der aufgetrennten Haut entfernt. Lediglich ein Teil der Haut wird wieder vernäht, der restliche Anteil bleibt offen, da in diesem Bereich nie sterile Verhältnisse zu erreichen sind:

Risiko: Blutung; Schwierigkeiten, den Stuhlgang zu kontrollieren.

Fistel: Der Fistelgang wird mit einer Sonde aufgesucht und gespalten, Hierbei entsteht ein Schnitt mit Öffnung nach außen, der nicht vernäht werden darf:

Risiko: Blutung; Schwierigkeiten, den Stuhlgang zu kontrollieren.

Fissur: Von einem separaten Schnitt aus, etwa 3cm vom After entfernt, wird der Schließmuskel durchtrennt.

Risiko: Schwierigkeiten, den Stuhlgang zu kontrollieren.

Sollten Sie zu Hause nicht zurecht kommen, rufen Sie bitte In der Praxis an. Tel: 0621/565215. Wenn Sie dort niemanden erreichen, können Sie In Notfällen auch privat anrufen.

Dr. Presting: 01727277088 Dr. Wagner: 06202/14490

Bitte unterschreiben Sie, dass Sie das Informationsblatt gelesen und verstanden haben.

Ludwigshafen, den

Unterschrift: _____